

П. В. ПЛЕССКИЙ

К орнитофауне верховьев реки Камы.

(Коллекция собранная Верхне-Камской орнитологической экспедицией).

Начальником Верхне-Камской орнитологической экспедиции проф.
Б. С. Духином и старшим научным сотрудником Академии Наук ССР
птическим куратором И. Г. Фраческим, а также в помощь им работали Борисовский и Баскаковский
волостей, Омутнинского уезда, Рыбинской губернии и Карсовайской волости,
Глазовского уезда, Вотской лесопромышленной области.

ВЕРХОВЬЯЕВ

И. Г. Фрачески.

В коллекции оказалось 26 видов.

К сожалению, большинство видов в коллекции представлено единичными экземплярами, вследствие чего в отчете о работе экспедиции не будет приводиться полного списка видов. Но в отчете о работе экспедиции в отдельных случаях дается описание дополнительных видов из коллекции: Альб. Бланк, Белоголовка и др.

РЕКИ КАМЫ

М. А. Мекабир. Птицы России. Т. I и II, 1895 г.

М. А. Мекабир. Орнитологическая география Европейской России. 1892 г. в 1892 г.

Dr. E. Hartt. Die Vogel des Russischen Reiches. 1910—1922 гг.

П. П. Сулимко. Список и распределение птиц Русского Алтая. 1925 г.

Пользуюсь случаем выразить благодарность академику

П. П. Сулиму за ценные указания при работе в ее распределении
использоваться для сравнения орнитологической коллекции зоологического
музея Академии Наук ССР.

Начальнику Верхне-Камской экспедиции проф. Б. С. Духину выражая
благодарность за предоставление для обработки орнитологических сборок
экспедиции.

1. *Hypothymis subtilis* (L.) — чирлок.

ад. 2, в начале Ачинца в осиново-бересклетовом лесу, 28. июля, опушка бересклета близ дер. Ефремово, Красногорского уезда.

ИЗДАНИЕ АВТОРА

Л. В. УДЕССКИЙ

ЗНАКОМСТВО С ДАФНИКОМ

БЕПХОВЕ

Перепечатано из Трудов Вятского
Научно - Исследовательского Ин-
ститута Краеведения. Т. IV.

ДАФНИК ЗНАКОМСТВО

Этотор. Птицы Башк. Аз. (Л.) — Sturniculus cyanurus (L.).

Бисерка Баха дер. Ефремята, Гординской волости.

Сент. 30. Мондоп мондоп в „ш.”

Кр. 34,0; хв. 25,2; пл. 3,6; кл. 1,8.

9. Dryoscopus martius (L.) — Чеглок Татаринский.

Бисерка Баха дер. Ефремята, Гординской волости.

К орнитофауне верховьев реки Камы.

(Список видов, собранных Верхне-Камской ихтиологической экспедицией).

Начальником Верхне-Камской ихтиологической экспедиции проф. Б. С. Лукаш мне была передана для определения небольшая коллекция птичьих шкурок (в количестве 37 экземпляров), собранная во время работ экспедиции в августе 1926 года в пределах Гординской и Бисеровской волостей, Омутнинского уезда, Вятской губернии и Карсовой волости, Глазовского уезда, Вотской автономной области.

Большинство экземпляров добыто охотником-коллектором экспедиции И. Г. Франчески.

В коллекции оказалось 26 видов.

К сожалению, большинство видов в коллекции представлено одним—двумя экземплярами, к тому же нередко только молодыми. Это обстоятельство не дало мне возможности в некоторых случаях довести определение до подвида (*Picoides tridactylus*, *Pica pica*, *Anthus trivialis*, *Regulus regulus* и др.).

При обработке я пользовался, главным образом, следующими руководствами:

М. А. Мензбир. Птицы России. Т. I и II, 1895 г.

М. А. Мензбир. Орнитологическая география Европейской России. 1882 г. и 1892 г.

Dr. E. Hartert. Die Vögel der paläarctischen Fauna. 1910—1922 гг.

П. П. Сушкин. Список и распределение птиц Русского Алтая. 1925 г.

Пользуюсь случаем выразить искреннюю благодарность академику П. П. Сушкину за весьма ценные указания при работе и за разрешение пользоваться для сравнения орнитологической коллекцией зоологического музея Академии Наук СССР.

Начальнику Верхне-Камской экспедиции проф. Б. С. Лукаш выражаю благодарность за предоставление для обработки орнитологических сборов экспедиции.

1. Hypotriorchis subbuteo (L.) — чеглок.

ad. ♂, в начале линьки в осенне, перо, 28 августа, опушка березняка близ дер. Ефремята, Гординской вол., Омутнинского уезда.

Кр. 25,9; хв. 13,8; пл. 3,6; кл. 1,8¹⁾.

¹⁾ Крыло измерялось по хорде, длина хвоста — от основания рулевых, клюв по прямой линии от угла клюва до вершины надклювья. Размеры даны в сантиметрах.

2. *Strigiceps cyaneus* (L.) — лунь полевой.

juv., в первом полном пере 30 августа, еловый перелесок близ дер. Ефремята, Гординской вол.

Кр. 34,0; хв. 22,5; пл. 7,0, кл. 2,6.

3. *Tetrastes bonasia* (L.) — рябчик.

В коллекции имеются 4 молодых экземпляра, заканчивающих линьку в наряд первой осени. Добыты 20 августа в еловом лесу (шохре) близ поч. Светлакова, Бисеровской вол., Омутнинского уезда.

№ 24. Кр. 14,5; хв. 7,7; пл. 34,7; кл. 1,8.

№ 25. Кр. 14,6; хв. 7,8; пл. 33,0; кл. 1,9.

№ 26. Кр. 14,7; хв. 7,7; пл. 34,0; кл. 1,8.

№ 27. Кр. 14,7; хв. 7,5; пл. 34,0; кл. 1,76.

4. *Lyrurus tetrix* L. — тетерев.

ad. ♀, почти закончившая линьку, 1 сентября, горелый лес близ речки Шукшур, около дороги между дер. Ефремята и с. Карсование.

5. *Tringoides hypoleucus* (L.) — кулик перевозчик.

juv. в первом полном пере, 9 августа, берег р. Камы близ поч. Светлакова, Бисеровской волости.

Кр. 10,2; хв. 5,1; пл. 2,2; кл. 2,5.

6. *Totanus ochropus* (L.) — кулик черныш.

juv. в первом полном пере, 13 августа, поч. Светлаков, Бисеровской вол. (на дворе).

Кр. 13,5; хв. 5,7; пл. 3,1; кл. 3,3.

7. *Columba livia* f. *domestica* (Bogd) — голубь.

ad. ♂, заканчивающий линьку в осенне перо, 28 августа, на озимы у дер. Ефремята, Гординской волости.

Кр. 21,2; хв. 11,7; пл. 2,8; кл. 2,2.

8. *Cuculus canorus* L. — кукушка.

juv. ♀, закончившая линьку в наряд первой осени, 19 августа, опушка елового перелеска близ поч. Светлакова, Бисеровской волости.

Кр. 21; хв. 16,5; пл. 21,5; кл. 2,6.

Второй молодой экземпляр добыт 31 августа в елово-березовом перелеске близ дер. Ефремята, Гординской волости.

Кр. 20,4; хв. 15,9; пл. 2,1; кл. 2,5.

9. *Dryocopus martius* (L.) — дятел черный, желна.

juv. 18 августа, опушка сырого елового леса близ поч. Копанского, Бисеровской волости, Омутнинского уезда.

Кр. 23,1; хв. 16,0; пл. 3,4; кл. 5,85.

10. *Dryobates major major* (L.) — дятел большой пестрый.

ad. ♂, в начале линьки, 13 августа, сухой сосновый бор близ поч. Светлакова.

Кр. 13,9; хв. 8,9; пл. 2,4; кл. 3,2.

ad. ♀, заканчивающая линьку, 19 августа, сосновый бор в Бисеровской вол. (Березовские починки).

Кр. 13,9; хв. 8,1; пл. 2,2; кл. 3,0.

juv. 21 августа, сосновый бор. близ поч. Светлакова, доб. Б. Лукаш.

Кр. 13,7; хв. 9,4; пл. 2,4; кл. 3,2.

При сравнении взрослых экземпляров с экземплярами орнитологической коллекции зоологического музея Академии Наук, они оказались принадлежащими к типичной форме.

11. *Picoides tridactylus* (L.) — дятел трехпалый.

juv. ♂, в птенцовом пере, в начале линьки в наряд первой осени, 17 августа, сухой еловый лес близ поч. Светлакова.

Кр. 11,9; хв. 7,1; пл. 2,0; кл. 3,0.

12. *Apus apus* (L.) — стриж.

juv. в первом полном пере, 13 августа, сухой сосновый бор близ поч. Светлакова. Птица сидела на пне и была поймана руками.

Кр. 16,5; хв. 6,4; пл. 1,3; кл. 1,1.

13. *Corvus cornix cornix* L. — ворона серая.

ad. ♂, заканчивающий линьку в осенне перо, 21 августа, близ поч. Светлакова. При сравнении с экземплярами орнитологической коллекции зоологического музея Академии Наук экземпляр оказался принадлежащим к типичной форме.

Кр. 30,0; хв. 17,4; пл. 5,8; кл. 5,4.

14. *Pica pica* (L.) — сорока.

juv. ♀, 11 августа, болото, поросшее березняком, близ поч. Светлакова.

Кр. 19,7; хв. 23,4; пл. 4,3; кл. 3,8.

15. *Emberiza citrinella erythrogenis* Brehm. — овсянка.

ad. ♀, в сильно изношенном пере, 9 августа, опушка сырого хвойного леса близ поч. Светлакова.

Кр. 8,5; хв. 6,8; пл. 1,9; кл. 1,2.

16. *Loxia curvirostra* L. — кисть еловик.

2 ad. ♂, добыты 11 августа в сухом сосновом бору близ поч. Светлакова.

№ 7. Кр. 9,8; хв. 5,8; пл. 1,7; кл. 1,7; высота надкл. у осн. 6,5 мм.; шир. подкл. у осн. 10,0 мм.

№ 8. Кр. 10,0; хв. 6,1; пл. 1,7; кл. 1,7; высота надкл. у основ. 6,2 мм.; ширина подкл. у осн. 11,3 мм.

17. *Pyrrhula pyrrhula* (L.) — снегирь.

juv. ♂, не закончивший еще линьку в наряд первой осени, 17 августа, торфяное болото близ поч. Светлакова. Нахождение экземпляра в птенцовом наряде с несомненностью указывает на факт гнездования снегира в исследуемом районе.

Кр. 8,8; хв. 6,4; пл. 1,8; кл. 1,2.

18. *Fringilla coelebs* (L.) — зяблик.

ad. ♂, 13 августа, опушка березняка близ поч. Светлакова.

Кр. 8,3; хв. 6,2; пл. 1,8; кл. 1,3.

juv. 21 августа, опушка березняка близ поч. Светлакова.

Кр. 8,8; хв. 6,4; пл. 1,8; кл. 1,28.

19. *Muscicapa striata* (Pall.) — мухоловка серая.

ad. ♀, 20 августа, близ поч. Светлакова. Кр. 8,5; хв. 5,6; плюсна 1,5; кл. 1,7.

20. *Anthus trivialis* (L.) — конек лесной.

juv. 10 августа, ржаное поле близ поч. Светлакова. Кр. 8,5; хв. 6,3; пл. 2,1; кл. 1,5; коготь задн. пальца 0,7 (по хорде); разница 3 и 4 маха 3,5 мм.; разница 4 и 5 маха 9,4 мм.

juv. 12 августа, опушка березняка близ поч. Светлакова. доб. Б. С. Лукаш. Кр. 8,9; хв. 6,2; пл. 2,1; кл. 1,4; коготь задн. пальца 0,7; разница 3 и 4 маха 2,7 мм.; разница 4 и 5 маха 9,0 мм.

juv. 17 августа, сосновый бор близ поч. Светлакова. Кр. 8,55; хв. 6,2; пл. 1,9; кл. 1,3; коготь задн. пальца 0,6; разница 3 и 4 маха 3,9 мм.; разница 4 и 5 маха 10,5 мм.

21. *Motacilla alba* L. — трясогузка белая.

juv. 17 августа, берег р. Камы близ починка Светлакова. Кр. 8,7; хв. 8,7; пл. 2,2; кл. 1,67.

22. *Parus borealis* Selys-Long. — гаичка.

ad. ♀, в сильно изношенном оперении, 29 августа, окр. д. Ефремята.
Кр. 6,1; хв. 5,7; пл. 1,57; кл. 1,05.

23. *Regulus regulus* (L.) — королек желтоголовый.

juv. 30 августа, окр. д. Ефремята. Кр. 5,4; хв. 4,15; пл. 1,7; кл. 0,95.

24. *Phoenicurus phoenicurus* (L.) — горихвостка.

juv. 13 августа, опушка березняка близ поч. Светлакова.
Кр. 7,8; хв. 5,6; пл. 2,1; кл. 1,3.

25. *Pratincola rubetra* (L.) — чеканчик луговой.

juv. 9 августа, опушка березового леса близ поч. Светлакова.
Кр. 7,25; хв. 4,4; пл. 2,1; кл. 1,5.

26. *Turdus viscivorus* (L.) — дрозд деряба.

ad. ♀, в сильно изношенном оперении, 13 августа, сухой сосновый
бор близ поч. Светлакова. Кр. 14,7; хв. 10,3; пл. 3,2; кл. 2,5.

juv. 9 августа, сырой хвойный лес близ поч. Светлакова. Кр. 12,9
хв. 7,3; пл. 2,9; кл. 2,5.
